

- ① 処方するには、事前に診察が必要です。
- ② 診察は、自由診療で保険の適用対象外となります。
- ③ 身元を保証するもの（運転免許証・健康保険証等）が必要です。
- ④ 診察の結果によっては、薬剤を処方できない事もあります。
- ⑤ 裏面の【EDチェックリスト】に必ずご記入いただき、以下の注意書きを了承された上で診察の受付をお願いします。

- 他の医療機関を受診する際には、ED治療薬を服用していることを確実に医師に伝えて下さい。
- ED治療薬の服用後に4時間以上勃起が続く場合は、すぐに医師に連絡してください。
- ED治療薬は催淫剤（性欲増強薬）ではありません。（性的刺激を受けなければ勃起しません）
- ED治療薬の服用後は、自動車や機械の運転操作には充分ご注意下さい。
- 食事中あるいは食事直後の服用では、効果が遅れてでることがあります。
- ED治療薬は性行為の約1時間前に服用し、1日1回までで、次の服用には24時間以上あけて下さい。
- 性行為は心臓に負担をかけます。無理はしないようにしましょう。
- ED治療薬は、他の人に譲り渡さないで下さい。

上記、注意書きを了承します。尚、裏面のチェックリストについては、私が記入しました

年 月 日 署名 \_\_\_\_\_ 連絡可能電話番号 \_\_\_\_\_

ED問診票 (IIEF5)

最近6ヶ月で該当するところに○をつけて下さい

		非常に低い	低い	普通	高い	非常に高い
勃起を維持する自信の程度はどれくらいありましたか？	0	1	2	3	4	5
性的刺激による勃起の場合、何回挿入可能な勃起の硬さになりましたか？	性的刺激一度もなし 0	全くなし 又は 殆どなし 1	たまに (半分より下 回る回数) 2	時々 (半分くら い) 3	おおかた毎回 (半分より上 回る回数) 4	毎回 又は ほぼ毎回 5
性交中、挿入後何回勃起を維持することができましたか？	性交の試み 一度もなし 0	全くなし 又は 殆どなし 1	たまに (半分より下 回る回数) 2	時々 (半分くら い) 3	おおかた毎回 (半分より上 回る回数) 4	毎回 又は ほぼ毎回 5
性交中に性交を終了するまで勃起を維持するのはどれくらい困難でしたか？	性交の試み 一度もなし 0	殆ど困難 1	かなり困難 2	困難 3	やや困難 4	困難でない 5
性交を試みた時に、何回満足に性交ができましたか？	性交の試み 一度もなし 0	全くなし 又は 殆どなし 1	たまに (半分より下 回る回数) 2	時々 (半分くら い) 3	おおかた毎回 (半分より上 回る回数) 4	毎回 又は ほぼ毎回 5

合計点数 \_\_\_\_\_ 点